

Kjære Pasient,

Din lege har startet behandling med Pradaxa® (dabigatranetexilat). Vennligst les informasjonen på dette kortet nøye.

Da dette pasientkortet inneholder viktig informasjon om din behandling er det viktig at du alltid har kortet med deg.

FÅ LEGEN DIN TIL Å FYLLE UT
PASIENTINFORMASJONEN




PRADAXA®
PASIENTKORT

Informasjon til pasienter

- Bruk alltid Pradaxa® nøyaktig slik legen din har forklart deg. Du må ikke avbryte behandling med Pradaxa® uten først å rådføre deg med legen. Avbrytelse av behandlingen eller glemt dose kan øke risikoen for blodpropp. Ved glemt dose, les pakningsvedlegget for instruks.
- Pradaxa® er et legemiddel som inneholder virkestoffet dabigatran etexilat. Det virker ved å blokkere en substans i kroppen som inngår i dannelsen av blodpropper.
- Siden dette legemidlet påvirker blodlevringen, har de fleste bivirkninger sammenheng med symptomer som blåmerker og blødninger. Tegn og symptomer på blødninger kan være hematom (blødning) i huden, svart avføring, blod i urinen, neseblod etc.
- Informer legen umiddelbart hvis du opplever noen av følgende bivirkninger: langvarig eller kraftig blødning, uvanlig svakhet, tretthet, blekhet, svimmelhet, hodepine eller uforklarlig hevelse.


- Informer legen om at du tar Pradaxa® dersom du skulle få behov for et kirurgisk inngrep. Informer alltid helsepersonell om at du bruker Pradaxa®.
- Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.

[I tillegg til å lese informasjonen gitt her, er det viktig at du leser pakningsvedlegget som følger med Pradaxa® pakningen.](#)




(Legens kontaktinformasjon)


Pasientinformasjon




(Pasientens navn)




(Fødselsdato)



(Indikasjon for antikoagulasjon)



(Dosering av Pradaxa®)



(Behandlingens varighet)